


Aleksandrów Kujawski, dnia 26 października 2023 r.



**INSPEKCJA WETERYNARYJNA**  
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
w ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

**wg rozdzielnika**

Nasz znak: PIWz.913.24.1.111.2023  
Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim przekazuje informację o zwiększającym się zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków i drobiu a także o wystąpieniu **dwóch nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu** w dn. 8.10.2023 r. oraz 16.10.2023 r. na terenie Polski. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o **pilne rozpropagowanie niniejszego pisma oraz załączonych ulotek informacyjnych w sposób zwyczajowo przyjęty, wśród mieszkańców gmin** powiatu aleksandrowskiego (wywieszenie na tablicy ogłoszeń, poinformowanie obiegami za pośrednictwem sołtysów lub poprzez SMS).

Jednocześnie przypomina się o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji w celu ochrony utrzymywanego drobiu przed zakażeniem wirusem grypy ptaków, zarówno wskutek kontaktu z dzikim ptactwem, jak i za pośrednictwem osób oraz środków transportu wjeżdżających do gospodarstw utrzymujących drób.

Więcej na temat bioasekuracji gospodarstw umieszczono na stronie internetowej PIW w Aleksandrowie Kujawskim <http://www.piw-aleksakuj.naszbip.pl>.

*z poważaniem*

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Aleksandrowie Kujawskim

*Dariusz Holc...*



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wyspiańskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski  
tel.: (54) 282-27-03, fax: (54) 282-30-06, e-mail: [sekretariat@piw-aleksakuj.pl](mailto:sekretariat@piw-aleksakuj.pl),  
[www.piw-aleksakuj.naszbip.pl](http://www.piw-aleksakuj.naszbip.pl)

# INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



**W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce, hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:**

1. Przechowywać drób w izolacji od dzikich ptaków;
2. Przechowywać paszę i ściółkę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z gryzoniami, dzikim ptactwem oraz ich odchodami;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie i ich odchody;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

## **Hodowco !!!**

**Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.**

### Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, nieborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.


## **UWAGA**

W przypadku gospodarstw utrzymujących więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie istnieje obowiązek posiadania planu bioasekuracji uwzględniającego profil produkcji gospodarstwa oraz co najmniej:


- a) podziału gospodarstwa na strefy „czyste” i „brudne” dla osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu
- b) procedur wprowadzania do gospodarstwa drobiu, pasz, ściółki, materiałów pomocniczych oraz sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w chowie i hodowli
- c) procedur czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu i wyposażenia oraz higieny osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu
- d) procedur zwalczania szkodników
- e) procedur rozdziału poszczególnych stad drobiu oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu drobiu z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego.




KRAJOWA RADA DROBIARSTWA  
IZBA GOSPODARCZA




# GRYPA PTKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?




**1** Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!




**2** Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione.




**3** Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.




**4** Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).




**5** Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.




**6** Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.




**7** Zadbaj o zabezpieczenie ściółki.




**8** Pamiętaj o dezynfekcji ściółki przed wniesieniem do kurnika.




**9** Zadbaj o izolację każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.



**10** Prowadź rejestr działań takich jak: oczyszczenie, odkażanie, dezynsekcja i deratyzacja.



**11** Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - trzymaj je w zamknięciu.



**12** Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skręty szyi, drgawki, biegunka, duszność) Nie zwlekaj - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!